

DR. DWAIRY, M.D / DR. PATEL, M.D / DR. KAUR, D.O / DR. ABRAHAM CHACKO / DR. SRINIVAS RAMIREDDY
MEDICAL ASSISTANTS: 832-707-5011

Recordatorio de Colonoscopia Dia de Procedimiento:

FORT BEND SURGICAL CENTER 14851 SOUTHWEST FWY SUGAR LAND, TX 77478 (281) 313-7300	MEMORIAL HERMANN FC 16906 SOUTHWEST FWY SUGAR LAND, TX 77479 (281) 243-1000	SUGAR LAND SURGERY CENTER 15300 SOUTHWEST FWY #100 SUGAR LAND, TX 77478 (281) 274-6670	METHODIST HOSPITAL SL 16655 SOUTHWEST FWY SUGAR LAND, TX 77479 (281) 274-7000
METHODIST HOSPITAL KATY 18500 KATY FWY HOUSTON TX, 77094 (832) 522-1000	HUMBLE KINGWOOD ENDO 19502 MCKAY BLVD # 101 HUMBLE, TX 77338 (281) 312-6900	MEMORIAL HERMANN KATY 21720 KINGSLAND BLVD KATY, TX 77450 (281) 492-1234	HCA NORTH CYPRESS 21214 NW FREEWAY CYPRESS, TX 77429 (832) 912-3500
KATY MEMORIAL ENDO. CTR. 1233 CAMPBELL ROAD HOUSTON, TX 77055 (713) 468-9200			

EI CENTRO HOSPITAL SE CONTACTARÁ CON USTED UN DÍA LABORAL ANTES DE SU PROCEDIMIENTO CON SU HORA REAL DE LLEGADA

DIA ANTES DEL PROCEDIMIENTO: COMENSAR DIETA DE SOLAMENTE LIQUIDOS CLAROS: TE, CALDO, CAFÉ / SIN CREMORA, JUGO DE MANZANA, SPRITE, GATORADE (NO COMIDAS SOLIDAS/ NO LIQUIDOS ROJOS O MORADOS)

DIA DEL PROCEDIMIENTO: NO COMER O BEBER NADA LA MANANA DEL DIA DE SU PROCEDIMIENTO! NO MASTICAR NADA INCLUSO GOMA DE MASCAR / MENTAS. SI PUEDE TOMAR SU MEDICAMENTO REGULAR, CON SOLO UN POCO DE AGUA.
NO ANTICOAGULANTE / INSAIDS. DEBE TENER UN ADULTO RESPONSABLE PARA CONDUCIRLO A CASA. Estarás sedado.

INSTRUCCIONES DE CLENPIQ

Un colon limpio es fundamental para la detección del cáncer de colon. La detección del cáncer de colon consta de dos pasos. El primer paso es una limpieza de colon, que es fundamental para el segundo paso, el examen completo de todo el colon. DEBE comprar tabletas de Dulcolax (Bisacodyl) Laxante y Gas-X sin receta. CINCO DÍAS ANTES: deje de tomar tabletas de hierro, aspirina, NSAIDS (ibuprofeno, Advil, Aleve, etc.) o anticoagulantes (Lovenox, heparina, Coumadin, Plavix, etc.)

DIA ANTES DE PROCEDIMIENTO:

8am to 11am: comience dieta de solo liquidos claros

12pm: Beba dos vasos grandes de líquidos claros y tome dos tabletas de Dulcolax.

3pm: Tome dos tabletas de Dulcolax.

5pm: Beber Primera Dosis: Beber todo el líquido del envase. Debe beber 40 onzas de líquidos claros ((durante las próximas cinco horas/líquidos claros de su elección ((NO ROJO NI MORADO))). Este paso es necesario para garantizar que esté bien hidratado, además de ayudar en la preparación de la colonoscopia.

6pm: Tome dos tabletas de Dulcolax y mastique 2 Gas-X tabletas.

9pm: Tome dos tabletas de Dulcolax.

10pm: Beba la segunda dosis: Beba todo el líquido del envase. Debe beber tres tazas de 8 onzas (taza provista) de líquidos claros durante las próximas 2 horas.

11:30pm Tome dos tabletas de Dulcolax y mastique 2 Gas-X tablets.

¡NADA POR BOCA DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE!

Existe la posibilidad de que el centro y/o la oficina le cobren una tarifa de cancelación si cancela menos de 7 días antes de su procedimiento. La patología puede demorar hasta 10 días hábiles. Lo cual se discutirá en su visita de seguimiento dos semanas después del día de su procedimiento. Recuerde llamar al **832-707-5011** para hacer una cita si aún no lo ha hecho.