

Recordatorio de Colonoscopia: Dia de Procedimiento: _____

FORT BEND SURGICAL CENTER 14851 SOUTHWEST FWY SUGAR LAND, TX 77478 281-313-7300	MEMORIAL HERMANN FC 16906 SOUTHWEST FWY SUGAR LAND, TX 77479 281-243-1000	SUGAR LAND SURGERY CENTER 15300 SOUTHWEST FWY #100 SUGAR LAND, TX 77478 281-274-6670	METHODIST HOSPITAL SL 16655 SOUTHWEST FWY SUGAR LAND, TX 77479 281-274-7000
METHODIST HOSPITAL KATY 18500 KATY FWY HOUSTON TX, 77094 (832) 522-1000	HUMBLE KINGWOOD ENDO 19502 MCKAY BLVD # 101 HOUSTON, TX 77338 281-312-6900	MEMORIAL HERMANN KATY 21720 KINGSLAND BLVD KATY, TX 77450 281-492-1234	

EI CENTRO HOSPITAL SE CONTACTARÁ CON USTED UN DÍA LABORAL ANTES DE SU PROCEDIMIENTO CON SU HORA REAL DE LLEGADA

DÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO: COMENSAR DIETA DE SOLAMENTE LIQUIDOS CLAROS: TE, CALDO, CAFÉ / SIN CREMORA, JUGO DE MANZANA, SPRITE, GELATINA, GATORADE (NO COMIDAS SOLIDAS/ NO LIQUIDOS ROJOS O MORADOS)

DIA DEL PROCEDIMIENTO: NO COMER O BEBER NADA LA MANANA DEL DIA DE SU PROCEDIMIENTO! NO MASTICAR NADA INCLUSO GOMA DE MASCAR / MENTAS. SI PUEDE TOMAR SU MEDICAMENTO REGULAR, CON SOLO UN POCO DE AGUA. NO ANTICOAGULANTE / INSAIDS. DEBE TENER UN ADULTO RESPONSABLE PARA CONDUCIRLO A CASA. Estarás sedado.

Instrucciones de Gallon (GaviLyte, Golytely, or PEG 3350)

DEBE comprar tabletas de Dulcolax (Bisacodyl) Laxante y Gas-X sin receta. CINCO DÍAS ANTES: deje de tomar tabletas de hierro, aspirina, NSAIDS (ibuprofeno, Advil, Aleve, etc.) o anticoagulantes (Lovenox, heparina, Coumadin, Plavix, etc.)

*** Si también se somete a una ENDOSCOPIA, asegúrese de suspender todos los medicamentos para el reflujo ácido 7 días antes del procedimiento ***

DAY BEFORE:

Temprano en la mañana: comience dieta de solo líquidos claros

12pm Beba dos vasos grandes de líquidos claros y tome dos tabletas de Dulcolax.

3pm Tome dos tabletas de Dulcolax.

5pm Beba la mitad de la jarra de un galón. Debe continuar bebiendo líquidos claros ((durante las próximas cinco horas/NO ROJOS NI MORADOS.)) Este paso es necesario para garantizar que esté bien hidratado, además de ayudar en la preparación de la colonoscopia.

6pm Tome dos tabletas de Dulcolax y mastique 2 Gas-X tabletas.

9pm Tome dos tabletas de Dulcolax.

10pm Beba la segunda dosis: mezcle 10 oz de agua en el recipiente con la preparación y bébalo en los próximos 30 minutos. Debe continuar tomando líquidos claros ((NO ROJO O PÚRPURA))

11:30pm Tome dos tabletas de Dulcolax y mastique 2 Gas-X tabletas.

¡NADA POR BOCA DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE!

La patología puede demorar hasta 10 días hábiles. Lo cual se discutirá en su visita de seguimiento dos semanas después del día de su procedimiento. Recuerde llamar al 832-707-5011 para hacer una cita si aún no lo ha hecho.