

Houston Regional Gastroenterology

Adeeb Dwairy, M.D / Pragnesh Patel, M.D/ Amandeep Kaur, DO Brenda (MA): 832-

707-5978

Colonoscopia Recordatorio \Dia de procedimiento :

Fort Bend Surgical Center
14851 SW FWY
Sugar Land, TX 77478
281-313-7300

Memorial Hermann FC
16906 SW FWY
Sugar Land, TX 77479
281-243-1000

Sugar Land Surgical Center
15300 SW FWY. Suite 100
Sugar Land, TX 77478
281-274-6670

EI CENTRO/ HOSPITAL SE CONTACTARÁ CON USTED UN DÍA LABORAL ANTES DE SU PROCEDIMIENTO CON SU HORA REAL DE LLLEGADA

DIA ANTES DEL PROCEDIMIENTO: COMENSAR DIETA DE SOLAMENTE LIQUIDOS CLAROS : TE , CALDO , CAFÉ / SIN CREMORA, JUGO DE MANZANA, SPRITE, GELATINA, GATORADE (**NO COMIDAS SOLIDAS/ LIQUIDOS ROJOS O MORADOS**)

DIA DEL PROCEDIMIENTO: NO COMER O BEBER NADA LA MANANA DEL DIA DE SU PROCEDIMIENTO ! NO MASTICAR NADA INCLUSO GOMA DE MASCAR / MENTAS. SI PUEDE TOMAR SU MEDICAMENTO REGULAR , CON SOLO UN POCO DE AGUA.

NO ANTICOAGULANTE / INSAIDS. DEBE TENER UN ADULTO RESPONSABLE PARA CONDUCIRLO A CASA. Estarás sedado.

INSTRUCCIONES DE SUPREP

Un colon limpio es crítico para la detección del cáncer de colon. La detección del cáncer de colon implica dos pasos. El primer paso es una limpieza de colon, que es fundamental para el segundo paso, el examen completo de todo el colon.

DEBE comprar tabletas de Dulcolax (Bisacodyl) Laxante y Gas-X sin receta. CINCO DÍAS ANTES: deje de tomar tabletas de hierro / sin aspirina, NSAIDS (ibuprofeno, Advil, Aleve, etc.) o anticoagulantes (Lovenox, heparina, Coumadin, Plavix, etc.)

***** Si también se somete a una ENDOSCOPIA SUPERIOR, asegúrese de suspender todos los medicamentos para el reflujo ácido 7 días antes del procedimiento *****

DIA ANTES DE PROCEDIMIENTO: Temprano en la mañana:

comience dieta de solo líquidos claros

12pm tome dos tabletas de Dulcolax.

3pm Tome dos tabletas of Dulcolax.

5pm Tome primer Dose Mezcle 10 oz de agua en el recipiente con la preparación y bébalo en los próximos 30 minutos. Debe continuar tomando líquidos transparentes ((durante las próximas cinco horas / SIN ROJO O PÚRPURA)) Este paso es necesario para asegurarse de que esté bien hidratado, además de ayudar en la preparación de la colonoscopia.

6pm Tome dos tabletss ode Dulcolax y mastique 2 Gas-X tabletas.

9pm Take two tablets of Dulcolax.

10pm Beba la segunda dosis: mezcle 10 oz de agua en el recipiente con la preparación y bébalo en los próximos 30 minutos. Debe continuar tomando líquidos claros ((NO ROJO O PÚRPURA))

11:30pm Tome dos tabletas de Dulcolax y mastique 2 Gas-X tablets.

¡NADA POR BOCA DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE!

La patología puede demorar hasta 10 días hábiles. Lo cual se discutirá en su visita de seguimiento dos semanas después del día de su procedimiento. Recuerde llamar al 832-707-5011 para hacer una cita si aún no lo ha hecho.